

# DISSERTAÇÃO,

SOBRE

A PERITONITES.

## THESE

APPRESENTADA, E PUBLICAMENTE SUSTENTADA,

PERANTE

A FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA,

NO DIA 3 DE ABRIL DE 1840.

POR

CANDIDO APRIGIO DA FONCECA GALVAÃO,

*Natural da mesma Cidade, e Cirurgião aprovado pela  
mesma Faculdade.*

PARA OBTER O GRAO

DE

DOUTOR EM MEDICINA.

---

**BAHIA**

Typ, de EPIFANIO J. PEDROZA & IRMÃO, RUA DO COLLEGIO, N. 58.—1840.

SECRETARIA CENTRAL  
DE CIENTIAS LA SAUDE  
U. F. R. J.

DATA  
02-06-80

N.º  
55

# ACADEMIA DE MEDICINA

DA

## BAHIA.

### LENTE PROPRIETARIOS.

### MATERIAS, QUE LECCIONAO.

Os Srs. Doutores.

F. de Paula d'Araujo e Almeida . . . Director.

ANNOS.

- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| 1.º                              | { M. M. Rebouças. . . . .                   | Botanica Medica, e principios elementares de Zoologia.                                      |
|                                  | { V. F. de Magalhães . . . . .              | Physica Medica.   |
| 2.º                              | { E. F. Franca . . . . .                    | Chimica Medica, e principios elementares de Mineralogia.                                    |
|                                  | { J. Abbot. . . . . <i>Examinador.</i>      | Anatomia geral, e descriptiva.  |
| 3.º                              | { F. de P. d'Araujo e Almeida. . . . .      | Physiologia.  |
|                                  | { J. Abbot. . . . .                         | Anatomia geral e descriptiva.   |
| 4.º                              | { F. C. da C. Dormund. . . . .              | Pharmacia, Materia Medica, Theurapentica, e Arte de formular.                               |
|                                  | { J. V. de F. A. Ataliba. <i>Examinador</i> | Pathologia interna.   |
|                                  | { M. L. Aranha Dantas. <i>Presidente.</i>   | Pathologia externa.   |
|                                  | { . . . . .                                 | Medicina operatoria, Apparelhos, e Anatomia topographica.                                   |
| 5.º                              | { F. M. Gesteira. . . . .                   | Partos, molestias de mulheres pejudadas, e de meninos recém-nascidos.                       |
| 6.º                              | { J. F. d'Almeida. <i>Examinador.</i>       | Medicina Legal.   |
|                                  | { J. Baptista dos Aujos . . . . .           | Hygiene, e Historia da Medicina.  |
| A. P. Cabral . . . . .           |   | Clinica interna, e Anat. Pathologica respect., annexa ao 5.º, e 6.º annos.                  |
| J. Antunes d'A. Chaves . . . . . |   | Clinica externa, e Anat. Pathologica respectiva, annexa ao 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, e 6.º annos. |

### LENTE SUBSTITUTOS.

- |  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| J. da Silva Gomes. . . . .             | } | Sciencias Accessorias. |
| . . . . .                              |   |                        |
| J. J. d'Alencastre. <i>Examinador.</i> | } | Secção Medica.         |
| J. de Sousa Velho. <i>Examinador.</i>  |   |                        |
| F. S. A. da R. Vieira . . . . .        | } | Secção Cirurgica.      |
| E. J. Pedrosa . . . . .                |   |                        |

### SECRETARIO.

O Sr. Dr. Ruydencio José de Souza Brito Colligipe.

A°

FAACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA,

*A quem deve a melhor parte de sua educação mental,*

O. D. C.

Em penhor de gratidão, e respeito,

**CANDIDO APRIGIO DA FONCECA E GALVAÕ.**

# DISSERTAÇÃO,

SOBRE

## A PERITONITES.

---

---

### THESE.

A inflamação da membrana serosa, que reveste a cavidade abdominal, conhecida pelo nome de — Peritonites, — he, na verdade, hoje bem demonstrada, depois dos importantissimos trabalhos de Bichat, sobre os diferentes tecidos, e da Thèse de Mr. Gaze, *sobre a doença das mulheres, em consequencia dos partos*; pois que, até então, ella estava confundida com as phlegmazias da maior parte dos órgãos contidos no abdomen, e era designada por diferentes denominações, taes como, --- gastrites, omentites, mezenterites, enterites, cystites, metrites, &c., e finalmente, nas mulheres de parto, pelo nome vago de --- febre puerperal; emittindo-se, por tanto, idéas as mais erroneas sobre sua natureza. Porém, depois dos dous authores citados, apparecerão outros muitos Medicos, entre os quaes, eu unicamente citarei Corvisart, Bayle, Laennéc, os srs. Broussais, Scoutten, A. Dugés, A. C. Baudelocque, e Tonnelle, os quaes publicarão importantes indagações, sobre esta phlegmazia.

Ella he pois hoje huma d'aquellas, cuja historia he a mais completa.

Quanto porém, ás formas, que ella appresenta, he aguda, ou chronica, continua, ou intermittente.

## DA PERITONITES AGUDA.

## HE A INFLAMMAÇÃO AGUDA DO PERITONEO.

*Cauzas.*

Ella póde ser produzida por todos os irritantes, que obrão directamente sobre a membrana, taes são: primeiro, as quedas, e as feridas feitas sobre as paredes do abdomen; segundo, a presença de hum corpo estranho na cavidade do abdomen, como se observa, principalmente na prenhez extra-uterina, e ainda mesmo, por occasião de derramamentos de sangue, de bilis, de urina, ou de materias fecaes; terceiro, a inflammação de huma parte vizinha; quarto, o estrangulamento de huma hernia; quinto, os esforços violentos, e sustentados por muito tempo; sexto, os abalos provenientes de tosse, ou de vomito. Finalmente, a peritonites tambem se desenvolve muitas vezes: 1.º, em consequencia da compressão das paredes abdominaes; 2.º, debaixo da influencia de hum ar frio, e humido; 3.º, em consequencia da immersão n'agua fria; 4.º, pelo resfriamento dos pés; 5.º, pela demora de vestidos molhados sobre o corpo; 6.º, depois da ingestão de huma bebida gelada, quando o corpo está suado; 7.º, em consequencia de huma indigestão violenta, e tambem por occasião da suppresão da menstruação: julga-se tambem, que ella póde ser epidemica.

Porém, a circumstancia, na qual a peritonites se manifesta mais frequentemente, he, em consequencia do parto.

Neste caso, com effeito, ella se desenvolve muitas vezes, debaixo da influencia da causa a mais ligeira, principalmente, por occasião de tudo, quanto póde supprimir rapidamente a evacuação dos lochios, ou a secrecção do leite: taes são, a impressão do frio, a cólera, ou a alegria excessiva, o terror, ou a tristeza.

Bem que porém muitas vezes acontece, que esta suppresão seja o effeito, e não a causa da peritonites; mas, nem por

isso , convém crer-se , que sempre assim succeda , como o pretendem sustentar alguns authores. O que he pois certo , e o que a observação nos prova diariamente , he , que o terror , ou a cólera , por exemplo , pôdem muito bem supprimir de repente os lochios , e fazer sobrevir immediatamente huma peritonites violenta.

He porém digno de notar-se , que esta phlegmazia se desenvolve ainda frequentemente , depois da execução de diferentes manobras , feitas , para terminar o parto , como sejão , por exemplo , a introdução da mão do parteiro no útero , o emprego do forceps , sobre tudo , quando taes operações tem sido longas , difíceis , e praticadas por pessoas pouco déstras. Tambem todas as violencias pôdem occasional-a. Assim , ella apparece muitas vezes , depois de pancadas , ou quedas , quando estas violencias são tão fortes , que chegão a determinar o aborto ; ora , d'aquí vem , que tambem a operação césareana , e a rotura da madre a provocão inevitavelmente. Além disto , a peritonites sobrevém , em consequencia , tanto de perdas uterinas abundantes , como ainda mesmo , por effeito dos meios , de que os Praticos se servem com o intuito de deter simillhantes perdas , como por exemplo , a applicação do frio , a compressão , e o tamponamento. Ora , he de notar-se , que a demora prolongada de hum fêto morto no útero predispõe a mulher á contrahir huma peritonites , e pôde mesmo occasional-a : da mesma sorte vê-se que a presença de coagulos sanguineos corrompidos , e a da placenta putreficada se tornão muito frequentemente causas determinantes desta enfermidade ; emfim , os desvios de regimen , a retenção rebelde , e prolongada , das fezes , ou das urinas , tem algumas vezes bastado , para determinall-a ; o mesmo alleitamento tambem a tem produzido em alguns casos. Demais , tem-se notado , que ella ataca frequentemente as mulheres ja tocadas de alguma phlegmazia aguda , ou chronica em hum órgão qualquer ; de onde se demonstra muito bem a verdade desta asserção do Pai da Medicina: *Si mulier , utero gerens , morbo aliquo minime cognato laboret , in partus purgatura perit.* Hippocrates , De Natura pueri. ---Sec. 5.º p. 229 ; edit Foës-

Assim pois , a viciação do ar nos Hospitaes , ou nas pri-

soens, ( como se vê em alguns Paizes, ) pela presença de miasmas deleterios, a faz algumas vezes reinar epidemicamente em taes estabelecimentos, imprimindo-lhe, além disto, e de ordinario, hum caracter de gravidade atterrador. Ora, (segundo dizem dois authores recommendaveis, Roche, et Sansón, ) tudo o que se tem dito de sua propriedade contagioza parece despi-do de fundamento: o mesmo succede, quanto á opinião, que attribue huma grande influencia, sobre sua produção, á presença de pretendidas saburras, ou materias putridas nas vias digestivas.

Eu porém, ápenas no tyrocínio da vasta, e arriscada tarefa de soccorrer á humanidade, tendo ainda pouco praticado, nada posso positivamente dizer á tal respeito.

Em geral, em consequencia dos partos, a inflammação começa pelo utero, e deste orgão, se propaga ao peritonéo, por contiguidade, e durante todo o seo curso, occupa estas duas sédes; d'aqui vem, que as peritonites puerperaes são mui raras vezes simples; ellas são pois, na mór parte dos cazos, métro—peritonites:—O que, em parte, nos explica sua gravidade.

#### SYMPTOMAS.

Depois de hum cali-frio, de huma duração mais ou menos longa, muitas vezes, sem que se tenha manifestado symptoma algum precursor, e algumas vezes, depois de dores vagas, as quaes se tem feito sentir em differentes pontos do abdomen, sobrevém huma dôr violenta, urente, pungitiva, fixa, ou móvel, circumscripta, ou extendida, na mesma região abdominal; dôr esta, que algumas vezes he tão intensa, que o doente não pode supportar o mais pequeno pezo sobre o ventre; ainda mesmo o das coberturas o vêxa, sendo, por tanto, impossivel apalpar-se-lhe o abdomen.

Muitas vezes tambem a dôr he menos intensa: porém a pressão abdominal a augmenta immediatamente. O doente está deitado, sobre o dôrso, e não pode, senão com muita difficuldade, guardar outra qualquer posição; pois, que o me-

nor movimento aggrava as suas dôres. Examinando-se o abdomen, vêem-se os hypocondrios distendidos, e se distingue ordinariamente huma sorte de tumôr oblongo, e renitente; tumôr este formado pelas circumvoluçoens intestinaes, inflammadas, e agglomeradas: o ventre se incha; sobrevém então arrotos, nauzeas, e mesmo vomitos, que fazem o doente soffrêr horrivelmente; a respiração he curta, porque as grandes inspiraçoens, repuxando o musculo diaphragma, sobre o peritonéo ja inflammado, augmentaõ ao doente os soffrimentos; a constipação he rebelde; bem que algumas vezes o doente sinta diarrhea, o que principalmente se observa nas mulheres paridas; o pulso he pequeno, e muito frequente; a fronte està enrugada, e as feiçoens pallidas parecem ser repuchadas para o cume do nariz, o qual he então affilado; finalmente, as extremidades estão frias. Desde este grão o mais elevado da peritonites aguda, até ao grão, que se approxima da peritonites chronica, as gradaçoens são infinitas, e existe tal destas gradações, em que a dôr abdominal, a retracção, e a constipação do ventre são unicamente os signaes, que annuncião a inflammação do peritonéo, e mesmo alguns cazos ha, em que a dôr he o unico symptoma caracteristico d'ella, e quando a peritonites he parcial, a dôr apenas occupa huma extensão muito limitada. Ha, todavia huma, a qual se annuncia por alguns caractéres particulares, tal he a peritonites hemorragica, na qual a dôr he fortissima; o pulso repentinamente se torna fraco, e lento; a pelle se resfria, e descora; os signaes da face se apagaõ, e o doente diz ressentir hum calor agradavel no abdomen, como se lhe fizessem corrêr, nesta cavidade, huma pequena quantidade de agua tepida.

Não he, por tanto, raro vêr-se a peritonites das mulheres paridas complicada de pleurizia; complicação esta ja por si mesma grave, e que he tanto mais temivel, quanto muitas vezes apenas ella se annuncia por alguns symptomas, e que a difficuldade de fazer tomar ás doentes as posições convenientes, para bem se auscultar, e percutir o peito, não permite quasi ja mais este soccorro. Ora, Mr. Baudelocque considera a fadiga, e a dôr, que as doentes sentem então, a-

tráz da parte inferior do osso sternon , como signaes quasi certos da inflammação da pleura , em circunstançias taes.

As outras doenças , com que a peritonites puerperal se pode complicar , são a encéphalites , aminingites , a bronchites , todas as anginas , e finalmente , a inflammação das membranas synoviales. Esta ultima complicação he mesmo assaz frequente.

#### DA MARCHA , DURAÇÃO TERMINAÇÃO , E PROGNOSTICO DA PERITONITES AGUDA.

A marcha da peritonites aguda he ordinariamente rapida. Ella póde ser tal , que em 24 horas , occazione a morte do individuo ; raramente excede o termo de 15 , á 20 dias , menos que , então , ella não passe ao estado chronico , ou que a cura se opere completamente ; o que quasi de ordinario tem lugar , do decimo ao decimo quinto dia. Com tudo , tem-se visto algumas vezes a peritonites aguda prolongar-se de trinta , á quarenta dias neste mesmo estado. Ella se termina pois de differentes maneiras : pela resolução , pela suppuração , ou derramamento , pela gangrena , e , finalmente , pela chronicidade. D'aqui se segue ser o prognostico sempre grave ; o que se nota principalmente nas mulheres paridas : ora , elle varia porém , conforme a extensão da inflammação , e ainda mais , em relação á sua intensidade , antiguidade , ao estado geral do doente , e &c.

#### DOS CARACTERES ANATOMICO-PATHOLOGICOS

Acha-se nos cadaveres dos individuos , que succumbem á peritonites aguda , o peritonéo vermelho , e condensado ; algumas vezes escuro , denegrido por laminas , e mesmo gangrenado ; falsas membranas , não organisadas ; pús , ou humas exsudação purulenta , extendida como em guardanapos (em napes ,) ham derrramamento de serozidade limpida , turva , e de cór rozea , e contendo muitas vezes flocos de fibrina descolorada , em suspensão ; algumas vezes tambem se nota sangue

líquido , ou em coelhos vermelhos , e espessos , ou então , apresentando a forma de membranas delgadas. He porém digno de notar-se , que , nas peritonites das mulheres paridas , a serosidade , que se derrama no peritonéo , he quazi , (ou talvez mesmo sempre) lactescente , e contém , em suspensão , flocos de fibrina descorada , e muito mais frequentemente , do que os que se observão nas peritonites ordinarias. Contudo , sem admittirmos com os partidarios exclusivos do humorismo , que o leite concorra para esta alteração da serosidade , *« nós pensamos , (dizem Roche , et Sansón ,) nós pensamos , que esta circumstancia merece fixar positivamente a attenção dos Praticos. »*

Em geral , talvez não se tenha muito em vista as circumstancias , em que esta doença de ordinario se desenvolve.

#### DO TRATAMENO DA PERITONITES AGUDA.

O tratamento da peritonites aguda se compoem de um pequeno numero de meios ; taes são : as sangrias geraes , ao principio , nos individuos fortes , e sanguineos ; porém , principalmente , as sangue-sugas applicadas , em grande numero , sobre os pontos dolorozos ; na vulva , ou no anus , nos cazos de suppressão dos menstros , dos lochios , ou do fluxo hemorroidal , e repetidas por tanto tempo , quanto a dôr o permittir ; porém , (para se tirar todo o proveito possível do emprego das emissões sanguineas ,) será sempre preciso pratical-as cedo , e tornal-as abundantes , áfim de fazer abortar a phlegmasia , desde o seu principio , e impedil-a , (caso possa ser ,) de chegar ao periodo , no qual o derramamento comessa á ter lugar.

Não se pôde jamais substituil-as pelas ventozas sarjadas , as quaes tem estes inconvenientes : cauzão muita dôr , fornecem pouco sangue , aterrão os doentes , e os obrigão á deichar o ventre , por muito tempo , exposto á acção do ár atmosphérico.

Quando pois , a violencia dos symptomas tem sido diminuida pelas sangrias geraes , então se conseguem os mais felizes effeitos do banho tepido , no qual se deicha o doente , durante muitas horas ; mas sua efficacia parece sêr limitada ás

peritonites puerperaes. Comtudo , empregão-se ao mesmo tempo as fricções emollientes , as bebidas mucilaginosas , acidulas , e ápenas tépidas , e finalmente , convem fazer-se ao doente observar a mais rigorosa diéta.

Se a peritonites he muito intensa , não convém , (nos primeiros dias ,) o uzo dos clisteres de qualquer natureza , que sejam ; pelo contrario , se ella he pouco intensa , ou quando se acha já diminuida , então prescrevem-se , e com feliz successo , quartos , ou quando muito , metades de clisteres mucilaginosos , e tornados narcoticos , pela junção da decoção de cabeças de papoilas : he porém de notar , que os clisteres inteiros prejudicão ; o que de certo provém da distensão , que elles operão sobre o intestino

Alguns Medicos ha , (principalmente os Inglezes ,) que gabão muito os bons effeitos da administração do proto-chlorureto de mercurio , (calomelanos preparados ;) ainda que por mim não seja observada sua efficacia ; comtudo , não me he possível duvidar della , á vista do grande numero de testemunhos , que elle conta em seu abono ; porém julgo , que só será util nas peritonites pouco violentas.

A maioria dos authores , que tanto o recommendão , concorda em dizer , que seo emprego he mais vantajoso , quando não prodús camaras , do que no cazo contrario ; d'aqui vem , que elles o associão aos narcoticos , áfim de impedir sua acção purgativa.

Administra-se pois o próto-chlorureto de mercurio , em doses gradualmente augmentadas , d'esde alguns grãos , até uma , ou duas oitavas , por espaço de 24 horas. Mr. Vandenzande , Profesor no grande hospital civil d'Anvérs , associou-o , e com vantagem , ao opio , e ao extracto de meimendro ; porém aconselha , que o Pratico se abstenha do emprego dos calomelanos , quando ha vomitos , ou diarrhéa , principalmente no primeiro d'estes dois casos ; por quanto elle pensa , que se pôde ainda administral-os , augmentando-se a dóse do opio , quando a diarrhéa he pouco consideravel. No caso pois , de que o doente apresente vomitos , e que a diarrhéa seja tão consideravel , que se possa aggravar , debaixo da influencia dos calo-

melanos, elle costuma substituil os por fricçoens de unguento mercurial praticadas sobre o ventre; medicação esta, da qual tambem eu tratarei logo.

Outros Medicos há, que empregão, segundo dizem, com vantagem, os purgativos moderados, taes são vg. o oleo de ricipo, o cremor—tartaro, o sulphato de soda, e &.ª : porém, he principalmente nas peritonites das mulheres de parto, que semelhantes agentes revulsivos aproveitão, e quando a applicação d'elles tem sido precédida do emprego dos antilogisticos, ou então, quando a inflamação não he muito intensa. Por tanto, he certo, que a constipação rebelde parece tornar mais grave a peritonites puerperal; o que dá satisfatoriamente a razão do alivio, que os doentes quazi sempre experimentão com as evacuaçoens alvinas moderadas. Roche, et Sanson confessão ter, por differentes vezes, recorrido, e com muita utilidade, ao oleo de ricino. Tem-se tambem aconselhado o uzo da camphora, e da quinna, separada, ou conjunctamente: porém Pouteau parece ter conseguido bons effeitos do primeiro destes medicamentos; elle administrava 15 grãos de camphora, em dóses muito approximadas humas das outras, e depois hia diminuindo-as, e dando sómente alguns grãos, de meia em meia hora. Roche, et Sansón citão vagamente mais alguns Praticos, os quaes dizem ter empregado a camphora, com muita utilidade.

Se estes dois authores, hõje tão recommendaveis, e celebres por seos conhecimentos, tanto theoreticos, como praticos, nada de positivo dizem á tal respeito; que poderei dizer eu, que ápenas principio á escrever estas poucas idéas? Em geral, pode-se muito bem affirmar, que os banhos de vapôr, e todos os outros sudorificos, internamente administrados, não são mais, do que hum pequeno soccorro no tratamento da peritonites aguda. Bem se vê, que o uzo dos vomitorios deve sér inteira, e severamente bannido do tratamento desta molestia, em razão do seo effeito inteiramente irritante.

Quanto porém aos antispasmodicos, elles, de ordinario, pouco, ou nada aproveitão, e mesmo pôdem muitas vezes prejudicar; por tanto, vale mais proscreever-se de huma vèz o uzo

de taes medicamentos. Bem que os revulsivos sejam mais uteis ; com tudo a applicação delles deverá ser feita , longe da séde da dôr , e depois do emprego das sangrias geraes , e locaes : d'aqui vêm necessariamente a razão , porque os vezicatorios applicados sobre o ventre , são os meios mais perigozos , de que a Therapeutica possa lançar mão , para combater a peritonites aguda. Tem-se igualmente preconizado , nestes ultimos tempos , as fricções mercuriaes , praticadas sobre o ventre , em doses elevadas , e rapidamente augmentadas , desde 5 , ou 4 oitavas , até 15 , ou 16 , em 24 horas. M.<sup>r</sup> Vandenzande parece ter sido o primeiro Facultativo , que teve a idéa de pôr em pratica esta medicação.

Depois da publicação de sua interessante Memoria , as fricções mercuriaes tem sido tentadas por muitos Praticos Francezes , e particularmente por Mr. Velpeau. Este Medico celebre reuniu em duas Memorias hum grande numero de observações clinicas , as quaes parecem positivamente demonstrar a efficacia desta medicação ; pois que , de 19 doentes , 14 ficarão inteiramente curados , pelo seu emprego. Porém , áfim de que se tornem efficazes , ( conforme a opinião deste Illustre Medico , ) estas fricções deverão ser feitas sobre todo o abdomen , com as precauções convenientes , e tendo-se a mão colerta com huma luva , para que as dôres se não augmentem ; sendo porém praticadas á todas as horas , com huma dose de 2 , ou 5 oitavas : porém deverse-há hir afastando humas das outras , ao mesmo tempo , que se forem reduzindo á huma oitava as doses do unguento mercurial , até que os symptomas se diminuão de uma maneira evidente : assim suspender-se-hão as fricções mercuriaes , logo que a salivação se manifeste. Tambem elle aconselha , que façamos sempre preceder o seu emprego pelo das emissões sanguineas , geraes , ou locaes , proporcionadas á força dos doentes , e á intensidade da inflamação , secundando-as com a administração dos calomelanos , na dose de 2 grãos , á todas as horas , e , enfim , que se lhe juntem banhos tépidos , e ligeiros calmantes , internamente administrados.

Roche , et Sanson dizem ter tido huma unica occasião de experimentar similhante methodo curativo , e isto mesmo , sem

fructo algum : pois que , [fallando elles de passagem ,] nos refferem , que de muitas centenas de partos , aos quaes tem assistido , desde que exercitão a Arte de curar , ápenas tem encontrado hum numero de peritonites pouco consideravel. Destas , somente duas forão mortaes.

D'aqui vêm , que , lendo-se , sem prevenção , os factos refferidos por Mr. Velpeau , na sua memoria ja citada , conclue-se , que , na mór parte dos casos , o successo tem sido devido antes ao concurso das emissões sanguineas , dos banhos , e dos calmantes , do que ao simples emprego do tão decantado tratamento mercurial , o qual , em circumstancias taes , he totalmente empyrico.

Façamos , por tanto , votos , para que novas experiencias venhão promptamente realizar as esperanças , que os primeiros ensaios nos fazem conceber.

#### DA PERITONITES CHRONICA.

He a inflammação chonica do peritonéo; inflammação tal , que ápenas hera conhecida , antes da bem escripta historia das Phlegmazias chonicas do Sr. Dr. Broussais.

#### CAUSAS.

A peritonites chronica , de ordinario succede á aguda ; bem que , todavia , d'esde o seo principio , ella possa apresentar esta forma , sendo as causas , que então a produzem , as mesmas da aguda , só com a simples differença de obra-rem mais lentamente , e com menos energia : ella tambem se desenvolve , debaixo da influencia de huma habitação doentia ; em lugares frios , e humidos , debaixo da de huma pressão continua , exercida sobre o abdomen , e dependente da profissão , ou genero de vida do individuo , das marchas forçadas ; dos alimentos de má qualidade ; da exposição ao frio , e á humidade , sobre tudo á noite , em huma sentinella , por exemplo ; dos derramamentos lentos de liquidos , de qualquer natureza ,

na cavidade abdominal, e, finalmente, do califrio das irritações intermitentes.

#### SYMPTOMAS.

Huma sensibilidade continua do ventre, a qual algumas vezes só se descobre pela pressão; huma ligeira tumefacção renitente, mais notavel á tarde, e quando a phlegmasia tem ja alguns dias de existencia; huma obscura fluctuação, a qual se manifesta mais de dia, á dia: a percussão, que se exerce então, para distinguir a prezença do liquido, he dolorosa; mas esta dor algumas vezes só se torna sensivel no épigastrio; os passos falsos, os abalos, e movimentos rapidos, como succede na équitação; na tosse, e sternutação, são sufficientes, para despertar-a. Mr. Broussais suppõe, que ella corresponde, ou, para melhor dizer, que he exclusivamente devida a sensação de huma bolla, que gira pelo ventre, e tende á dirigir-se á garganta, á agglutinação dos intestinos, que, com as glandulas do mezentério ja engorgitadas, formão huma certa massa arredondada, e movel, a qual rôla no abdomen.

Tal he a opinião de Mr. Broussais, o qual de certo deo á similhante phenomeno esta explicação, que em tudo concorda com a doutrina physiologica.

A' todos estes symptomas locaes se juntão algumas vezes a frequencia do pulso, e o augmento do calor á tarde; de mais, ha dispnéa, quando o doente está horisontalmente collocado, se o derramamento he alguma cousa consideravel; tambem algumas vezes ha tósse, e perda total do appetite: as urinas se tornão parcas, turvas, e cada vez mais difficeis, e, emfim, sobrevém a edemacia das extremidades inferiores, quando a duração da peritonites chronica tem sido longa, e que a morte se approxima. Em summa, em alguns casos, os symptomas da peritonites se limitão á tumefacção do ventre, á constipação, e á huma ligeira dor. Se bem, que seja precisa a pressão de cada lado do ventre, para pôr em evidencia este ultimo symptoma. Quanto porém aos signaes infalliveis, e caracteristicos do derramamento da serosidade no abdomen, são unicamente estes: o augmento gradual do ventre, e a fluctua-

ção, que ahí se faz perceber, quando, approximando-se a palma da mão sobre hum dos lados, percute-se o outro com a extremidade dos dedos. Chama-se --- *ascites* --- esta accumulção de liquidos no abdomen.

#### DA MARCHA, DURAÇÃO, TERMINAÇÃO E PROGNOSTICO.

Bem como em todas as outras phlegmazias chónicas, a marcha, e a duração da peritonites chónica são dificeis de determinar-se, ainda mesmo de huma maneira approximativa; por quanto muito raramente a cura, e o compléto restabelecimento do individuo coroa os esforços, e fadigas do Medico; sendo a morte a consequencia quazi inevitavel da peritonites chónica. Taõ funesto resultado provém pois do marasmo, da hydropesia, a qual se manifesta ás vezes, muitos annos depois desta molestia, ou finalmente, sua exasperação subita.

#### DOS CARACTERES ANATOMICO-PATHOLOGICOS.

Acha-se na abertura dos cadaveres dos individuos, que succumbem á peritonites chónica, entre as laminas do peritonéo, hum derramamento mais, ou menos consideravel de um fluido limpido, e amarello, leitozo, purulento, ou esverdinhado, acinzentado, rouxo, e fétido, contendo em suspensão flócos fibrinosos; falsas membranas, adherencias, espessamento da membrana — peritonéo; — granulações pisiformes, e esbranquiçadas, pequenos depositos de materia pultacea, ou tuberculosa, no tecido da membrana; o espessamento com hum aspecto lardaceo, cancrozo, e, algumas vezes, com alteração do tecido post, e interperitoneal, — e mesmo do épiploon; derramamentos sanguineos, érosoens, ou ulceras; ou então, a gangrena, o estado cartilaginozo do peritonéo, a ossificação, as concreções, e, emfim, hydatides.

#### DO TRATAMENTO DA PERITONITES CHRONICA.

Por pouco, que a peritonites chónica conserve alguns caractéres do estado agudo, deve-a-he-mos tratar pelo mesmo

methodo curativo , proporcionando , com tudo a energia dos meios á sua intensidade.

Mas convém muita perseverança no emprego do methodo anti-phlogisto , para que possámos colhêr d'elle , os esperados fructos. Ora , quando a peritonites he antiga , pouco dolorosa , sem frequencia do pulso , nem augmento do calôr da pelle ; as sangrias locaes são poucos efficazes , principalmente , se há algum derramento hum pouco consideravel. Todavia , podel-as-he-mos applicar huma , ou duas vezes , em derredor da sêde da dôr , antes de começar-se qualquer outro tratamento ; porém , se o derramamento he pouco consideravel , e , com maior rasão , se não existe ; se ao mesmo tempo a dôr he circunscripta , e que hum tumôr renitente se faz perceber ; applicão-se com muita utilidade , n'este ponto , cauterios ; cuja suppuração convém , que seja intretida por muito tempo. Tambem aproveitão bastante as fricçoens seccas sobre a pella , os banhos de vapôr , e os vestidos de flanella. Quando o estado do estomago , e dos intestinos o permittir , prescreveremos ao doente o uzo interno dos sudorificos , e diuréticos ; quando não , limitarnos-hemos ao emprego das bebidas gommozas , acidulas , ou , quando muito , ligeiramente nitradas. O leite , e as substancias feculentas , tâes como a tapióca , e arrow-root , &c. devem fazer a bási da nutrição do doente.

Finalmente , as diversas limonadas acidulas , a agua de goma-arabica , ou de arróz , o soro de leite , e &c. , são preciozos recursos , dos quaes um Pratico habil , e prudente póde , e deve então lançar mão , para completamente combater hum tão cruél inimigo , e d'elle alcançar uma victoria , inteiramente digna da nobre Profissão , que exerce.

#### DA PERITONITES INTERMITTENTE.

A peritonites da mesma sorte , que todas as mais inflammções , póde appresentar-se intermittente. He de notar , que os exemplos disto são raros. Mr. Mongellaz , cita uma observação , que lhe foi communicada pelo Dr. Dupré : a peritonites se mostrou então successivamente terçã , e quartã.

Tambem outro exemplo disto nos forneceo Mr. Senéle. Os outros dois casos referidos por Mr. Mongellaz estão longe de ser evidentes.

Portanto, a peritonites intermittente constitue a *febre perniciosa peritonitica dos authores*.

Ella pois não offerece nada de mais particular, em suas causas, seos symptommas, e seo tratamento, do que as outras phlegmazias chronicas.

F I M.

HIPPOCRATIS APHORISMI.

I.

Dolores, qui in ventre fiunt, elati quidem, leviores: non elati veró, vehementiores. Sect. 6. Aph. 7.

II.

Cui persecta est vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepar, lethale. Sect. 6. Aph. 18.

III.

Quibus in febre ardente tremores fiunt, delirium solvit. Sect. 6. Aph. 26.

IV.

Deliria, cum risu quidem accidentia, securiora: cum studio veró, periculosiora. Sect. 6. Aph. 53.

V.

A dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio, malum. Sect. 7. Aph. 22.

VI.

A dolore vehementi partium circa ventrem, extremarum frigus, malum. Sect. 7. Aph. 26.

Vista. Bahia 5 de Março de 1840.

Dr. Manoel Ladislão Aranha Dantas.